

TERQUEM

**Simplification dans la soustraction de
deux fractions numériques. D'après M.
Bardel, ancien bénédictin**

Nouvelles annales de mathématiques 1^{re} série, tome 5
(1846), p. 671

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1846_1_5_671_1

© Nouvelles annales de mathématiques, 1846, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

SIMPLIFICATION DANS LA SOUSTRACTION

de deux fractions numériques; d'après M. Bardel, ancien bénédictin. (Comptes rendus de l'Acad., 2^{me} série, 1835, p. 44).

—

On a : $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a(d-c) - c(b-a)}{bd}$; lorsque a et b , c et d

diffèrent peu, le numérateur du second membre est plus facile à effectuer que le numérateur ordinaire $ad - bc$.
