Séminaire d'analyse fonctionnelle
École Polytechnique

Errata aux exposés 0, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

Séminaire d'analyse fonctionnelle (Polytechnique) (1973-1974), p. 1-2

<http://www.numdam.org/item?id=SAF_1973-1974____A28_0>

© Séminaire Maurey-Schwartz
(École Polytechnique), 1973-1974, tous droits réservés.

L'accès aux archives du séminaire d'analyse fonctionnelle implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM
Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

SEMINAIRE MAUREY-SCHWARTZ 1973-1974

E R R A T A

Pages	Au lieu de :	Lire :
Exposé 0, titre	Nykodym	Nikodym
III.6 Ligne 2	$(\int \|\|\Sigma \|f_n(\theta)u(x_n)\|\|^r d\theta)^{\frac{1}{r}}$	$(\int \|\|\Sigma\ f_n(\theta)u(x_n)\|\|^r d\theta)^{\frac{1}{r}}$
III.8 Ligne 12	la série $\Sigma\ x_{n\ n}$	la série $\Sigma\ x_n f_n$
VI.5 Ligne 4	pour $p = 1+\varepsilon$	pour $q = 1+\varepsilon$
VI.7 Ligne 14	vérifie ainsi (2)	vérifie aussi (2)
VII.2 Ligne 5	Dvoretzsky	Dvoretzky
VII.2 Ligne 6	$\left\| \sum_{(i-1)<j\leq ik} \varepsilon_j^i x_j \right\|$	$\left\| \sum_{(i-1)k<j\leq ik} \varepsilon_j^i x_j \right\|$
VII.5 Ligne 1	un entier N >	un entier N > 1
VII.8 Ligne 6	type p-Rademacher	type q-Rademacher
VII.10 Ligne 4	$\mu_n(E)$	$n\ \mu_n(E)$
VII.10 Ligne 7	$\mu_n(E) < (\frac{n^2+(2^{n-1}-1)n^2}{2^{n-1}})^{\frac{1}{2}})=1$	$n\mu_n(E) < (\frac{n^2+(2^{n-1}-1)n^2}{2^{n-1}})^{\frac{1}{2}})=n$
VIII.2 Ligne 3	$\sum_{i=N+1}^{i=n} i^{1/2+1/p'}$	$\sum_{i=N+1}^{i=n} \frac{1}{i^{1/2+1/p'}}$
VIII.3 Ligne 4	$\limsup_{n\to\infty}(n^{1/p'}\nu_n(E))\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{p},)^{-1}$	$\limsup_{n\to\infty}(n^{1/p'}\nu_n(E))(\frac{1}{2}-\frac{1}{p},)$
VIII.4 Ligne 3	$\sqrt{n_n-1}\ \nu_{n_k-1}(E)$	$\sqrt{n_k-1}\ \nu_{n_k-1}(E)$
X.12 Ligne 1	$\pi_{p,G}(v)$	$\pi_{q,G}(v)$
XII.2 Ligne 2	opérateur w de E" dans E	opérateur w de $[x_1,\ldots,x_n]$ dans E

Pages	Au lieu de :	Lire :
XIII.11 Ligne 3	$> \sum_{j=1}^{2^k} \|\|w_{kj}\|\| \ldots$	$- \sum_{j=1}^{2^k} \|\|w_{kj}\|\|$
XIII.11 Ligne 2	$- \dfrac{(1+\delta)\ \dfrac{1}{6.4^{k+1}}}{A_{k+1}(A_{k+1}+\dfrac{\delta}{6.4^{k+1}})}$	$- \dfrac{(1+\delta)\dfrac{\delta}{6.4^{k+1}}}{A_{k+1}(A_{k+1}+\dfrac{\delta}{6.4^{k+1}})}$
XIII.20 Ligne 12	$\frac{M+1}{2}\|\|x\|\|$	$\frac{M+1}{2}\|\|x\|\|_{\mathcal{U}}$
XIII.20 Ligne 6	$\frac{1}{M+1}(\|\|x\|\|_1+\|\|y\|\|_1+\ldots$	$\frac{1}{M+1}(\|\|x\|\|_1+\|\|y\|\|_1)+\ldots$
XIV.6 Ligne 2	f(n)	f(x)
XVII.5 Ligne 10	les points $z_1,\ldots z_n\ldots$ forment un arbre infini dans W.	pour tout n les points $(z_{1,\ldots,}z_{2^n})$ forment une (n,θ)-branche d'arbre dans W.
XVII.4 Ligne 4	$\forall\ x,y \in V$	$\forall\ x,y \in F,\ j_W(x)=j_W(y)=1$
XVII.9 Ligne 10	$(1-\delta)\ j_W(z)$	$(1+\delta)\ j_W(z)$
XIX.4 Ligne 2	$[\lambda(n)]$	$[\lambda(n)]^{-1}$
XIX.14 Ligne 4 Ligne 11	espace de Banach	espace de Banach de dimension infinie.

⁂